

この度は、「薬ゼミの出る本改訂第4版」をご購入いただき、誠に有難うございます。
 本書について、以下のとおり補足及び訂正させていただきます。
 ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんが、何卒宜しく願い申し上げます。

薬学ゼミナール編集 薬ゼミの出る本改訂第4版 補足及び訂正一覧表

下表は、国民健康・栄養調査の結果(令和元年)に伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P9 衛生 6行目	……2018年(平成30年)における日本人のカルシウム摂取量は男性 514mg/日、女性 497mg/日(国民健康・栄養調査結果の概要)であるため、……	……2019年(令和元年)における日本人のカルシウム摂取量は男性 517mg/日、女性 494mg/日(国民健康・栄養調査結果の概要)であるため、……

下表は、第十八改正日本薬局方(令和3年6月告示)に伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P5 法規 1行目	……。 (第十七改正日本薬局方)	……。 (第十八改正日本薬局方)
P10 法規 2行目	……。 (第十七改正日本薬局方)	……。 (第十八改正日本薬局方)

下表は、人口動態統計の概況(令和元年)に伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P71 衛生 3行目	……「大腸」が多い。	……大腸や乳房が多い。

下表は、2020年6月のがん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2020年版(日本緩和医療学会)発刊に伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P170 実務 1行目	……鎮痛薬投与の基本5原則 ①経口投与が基本 ②痛みの強さに応じた鎮痛薬の選択 ③痛みが消える個別的な量で投与 ④時間を決めて、規則正しく投与 ⑤副作用に対する防止策を行う	……鎮痛薬投与の基本原則 ①経口投与が基本 ②時間を決めて、規則正しく投与 ③患者ごとに個別的な量で投与 ④細かい配慮をもって投与
P170 実務 凶 WHO3段階除痛ラダー	強オピオイド鎮痛薬 モルヒネ オキシコドン フェンタニル タペンタドール	強オピオイド鎮痛薬 モルヒネ オキシコドン フェンタニル タペンタドール ヒドロモルフォン