

この度は、「コアカリ重点ポイント集〔改訂第8版〕vol.2」をご購入いただき、誠に有難うございます。

本書について、以下のとおり補足及び訂正させていただきます。

ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんが、何卒宜しくお願ひ申し上げます。

薬学ゼミナール編集 コアカリ重点ポイント集〔改訂第8版〕 vol.2

補足及び訂正一覧表

	訂正前	訂正後
P48 赤血球恒数	正球性(MCV 低値)	正球性(MCV <u>正常</u>)
P224 【病態と症状】 検査 1行目	…→冠状T波(経時的に変化)	…→ <u>冠性</u> T波(経時的に変化)
P224 【治療】心筋梗塞治療薬 表	チクロジピン	チクロ <u>ビ</u> ジン
P225 ■1.4.1 高血压表 降圧目標 ・上段 6行目 ・家庭血压下段	CKD 患者(タンパク尿陰性) $<135/8$	CKD 患者(タンパク尿陽性) $<135/\underline{85}$
P281 問 156	正 …子宮平滑筋を収縮し、圧迫することで血行を阻止し、分娩後の子宮出血を低下させる。	誤 …子宮平滑筋収縮作用を示す。
P319 問 52	正	誤
P536 ■2.1.1 漢方医学の診断方法 2行目	…患者の症状を、八綱、気血水、…	…患者の症状を、八綱、気血水、…
P609 問 79	誤	正
P650 表 コンパニオン診断実施例 ⑥ゲフィチニブ	変異型で治療効果減弱	変異型陽性で治療効果あり
P655 問 29	新生児の胃内pHは、出生直後ではほぼ中性である。	新生児の胃内pHは、ほぼ中性である。
P832 ■1.3.6 直腸に適用する製剤 1つ目の表 4行目	解毒鎮痛薬	解熱鎮痛薬